

Ekosistemlerde Enerji Akışı ve Sürdürülebilir Çevre



Çoktan Seçmeli Sorular

1. (5 Puan)

Sürdürülebilir kalkınma; madde döngülerinin sürekliliğine, ekolojik dengenin korunmasına ve ekosistemdeki her bir canlı grubunun işlevinin devam etmesine dayanır. Madde döngüsündeki bir kırılma tüm sistemi etkiler.

Bir ekolog, izole bir adada karbon döngüsünün kesintiye uğradığını, atmosferdeki CO₂ oranının hızla düştüğünü ancak topraktaki organik atık miktarının son üç yılda iki katına çıktığını tespit etmiştir. Araştırmada elde edilen ek verilerde, adadaki ortalama sıcaklığın değişmediği ve birincil tüketicilerin popülasyonlarında küçük bir azalma olduğu belirtilmektedir. Ekolog bu verileri sürdürülebilir kalkınma perspektifiyle incelediğinde, ekosistemin çökmesini engellemek için acil olarak hangi müdahaleyi planlamalıdır?

- A) Topraktaki inorganik tuz oranını azaltmak için kimyasal gübre kullanımını yasaklamak
- B) Besin zincirini dengelemek amacıyla adaya dışarıdan ikincil tüketiciler getirmek
- C) Fotosentezi hızlandırmak için adaya daha fazla üretici bitki türü yerleştirmek
- D) Saprofit canlıların popülasyonunu destekleyecek ortam şartlarını yeniden oluşturmak

2. (5 Puan)

Bir grup arařtırmacı, kapalı bir sera ekosistemi tasarlamıřtır. Seraya üretici bitkiler, otçul böcekler ve etçil kurbağalar konulmuř, sıcaklık 25°C, nem %60 olarak sabitlenmiř ve günlük 12 saat ıřık verilmiřtir. Sistem ilk 3 ay dengeli çalıřmıř, ancak 4. aydan itibaren bitkilerde sararma, büyümede durma ve toprakta biriken ölü canlı/atık miktarında aşırı artış gözlenmiřtir. Aynı dönemde havadaki O₂ seviyesi %21'de kalırken, toprak analizinde nitrat ve fosfat minerallerinin sifıra yaklařtığı tespit edilmiřtir.

Sera içindeki verilerin analizi sonucunda, ekibin yařadığı problemin temel nedeni ve çözüm yolu ařağıdakilerden hangisinde dođru deđerlendirilmiřtir?

- A) Ayrıřtırıcıların yokluđu organik atıkların parçalanıp inorganik maddelere dönüşmesini engellemiř, madde döngüsünü durdurmuřtur; çözüm olarak mantar ve saprofit bakteri eklenmelidir.
- B) Sorun karbon döngüsünün hızlanmasıdır; çözüm olarak seraya karbondioksit tüketen üretici bitki takviyesi yapılmalıdır.
- C) Ayrıřtırıcı faaliyetleri durduđu için topraktaki inorganik madde artışı fotosentezi durdurmuřtur; çözüm olarak klorofil sentezleyici bakteriler eklenmelidir.
- D) Azot bađlayıcı bakterilerin aşırı çođalması toprakta organik madde birikimine neden olmuřtur; çözüm olarak ortama azot tüketen tüketici canlılar eklenmelidir.

3. (5 Puan)

Ekolojik piramitlerde trofik düzeyler arasında enerji akışı, biyolojik birikim ve birey sayısı iliřkileri, türler arası etkileřimleri belirler.

Deniz ekosistemini inceleyen bir arařtırmacı, aynı ortamda yařayan dört farklı canlının (X, Y, Z, T) dokularındaki DDT (tarım ilacı) birikimini ölçerek ařağıdaki grafiđi elde etmiřtir.

(Grafik verileri: T: 0.04 ppm, X: 0.5 ppm, Z: 2.0 ppm, Y: 13.8 ppm)

Arařtırmacı, ortamın yıllık sıcaklık ortalamasının artmasıyla türlerin popölasyonlarında deđiřimler gözlemlemiřtir. Yapılan bir tahmine göre, "Eđer X türünde ani bir salgın hastalık nedeniyle büyük bir ölüm yařanırsa, Y türünün sayısında hemen bir artış, T türünün sayısında ise belirgin bir düşüř gözlenir."

Buna göre, arařtırmacının yapmıř olduđu tahminin ekolojik deđerlendirmesi için ařağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Tahmin yanlıřtır; biyolojik birikimi en az olan T türü üreticidir ve popölasyon büyüklüđu tüketici sayısındaki dalgalanmalardan etkilenmez.
- B) Tahmin dođrudur; çünkü X türü azalırsa, onunla beslenen Y türünün besin rekabeti azalır ve üretici olan T türü hızla tükenir.
- C) Tahmin yanlıřtır; biyolojik birikime göre besin zinciri $T \rightarrow X \rightarrow Z \rightarrow Y$ şeklindedir. X azalırsa, Z'nin besini azalacađından Z azalır, bu da Y'nin de azalmasına neden olur.
- D) Tahmin dođrudur; biyolojik birikimi en yüksek olan Y türü, ortamdaki diđer türler üzerinde baskı kurarak her durumda sayıca artacaktır.

4. (5 Puan)

Bir araştırma merkezinde kurulan tamamen kapalı biyosfer modelinde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar bulunmaktadır. Atmosferdeki gaz oranları ve sıcaklık dışarıdan kontrol edilebilmektedir. Sistem kendi içinde madde döngüsünü sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kapalı bir yapay biyosfer deneyinde, ortamdaki sıcaklığın kazara 60°C'ye çıkması sonucu toprakta bulunan ve sadece organik atıkları ayrıştıran tüm bakteri ve mantar türleri ölmüştür. Ortamda bol miktarda su (H₂O), karbondioksit (CO₂) ve güneş ışığı bulunmasına rağmen, bir süre sonra sistemdeki bitkilerin fotosentez hızının yavaşladığı ve bitkilerin ölmeye başladığı gözlemlenmiştir. Araştırmacılar ortam sıcaklığını 25°C'ye düşürüp toprağa bol miktarda inorganik azot, fosfor ve potasyum (NPK) gübresi eklediklerinde, bitkilerin büyümesi tekrar normale dönmüştür. Bu deneye göre, ayrıştırıcıların sistemdeki asıl rolü ve başlangıçtaki sorunun kaynağı aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde açıklanmıştır?

- A) Yüksek sıcaklık organik atıkların yapısını bozmuştur, ayrıştırıcıların asıl görevi bitkilere doğrudan organik besin sağlamaktır.
- B) Ayrıştırıcıların yokluğunda ortamdaki oksijen miktarının tükenmesi fotosentezi durdurmuştur; gübre eklenmesi oksijen üretimini tetiklemiştir.
- C) Ayrıştırıcılar organik atıklardaki mineralleri serbest bırakmadığı için bitkiler topraktan inorganik tuzları alamamıştır; gübre bu eksikliği gidermiştir.
- D) Ayrıştırıcılar fotosentez için gerekli olan karbondioksiti üretememiştir; gübre eklenmesi topraktaki karbon miktarını artırmıştır.

5. (5 Puan)

Birleşmiş Milletler raporuna göre dört farklı ülkenin (X, Y, Z, W) kalkınma planları uygulanmıştır. Rapor detayları şöyledir:

- X Ülkesi: Organik atıkların tarımda kompost olarak kullanımını artırmak için teşvikler vermiştir. Son 5 yılda orman alanları %2 artmıştır.
- Y Ülkesi: Sanayi atık sularındaki fosforu geri kazanarak gübre üretimine geçmiştir. Yıllık enerji tüketimi %5 artmasına rağmen temiz su kaynakları korunmuştur.
- Z Ülkesi: Ekonomik büyümeyi hızlandırmak için orman arazilerini tarıma açmış, kimyasal gübre kullanımını %40 artırarak kısa vadede mahsul verimini %25 yükseltmiştir. Ancak yeraltı sularındaki azot oranı güvenli sınıırın üzerine çıkmıştır.
- W Ülkesi: Nüfus artışını dengelemek amacıyla dış göçü sınırlamış, plastik ambalajları yasaklayarak biyobozunur malzemelere geçmiştir. (Göç politikası ekolojik veriden bağımsızdır).

Bu planların uygulandığı dört ülkede 5 yıl sonra gözlemlenen ekolojik veriler tabloda verilmiştir. Verilere göre, hangi ülkenin izlediği politika sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve madde döngülerinin işleyişiyle doğrudan çelişir?

- A) Z Ülkesi
- B) Y Ülkesi
- C) X Ülkesi
- D) W Ülkesi

6. (5 Puan)

Bir biyoloji araştırmacısı kapalı bir sera ekosisteminde birbirleriyle etkileşimde olan K, X, Y ve Z canlı türlerini gözlemliyor. Araştırma verilerine göre; K canlısı kloroplast taşıyan ve popülasyon biyokütlesi en fazla olan türdür. Ortama Y canlısına etki eden ancak T adındaki ayrıştırıcılara zarar vermeyen seçici bir hastalık etkeni bırakılıyor ve Y canlısının sayısı hızla azalıyor. Ayrıca sisteme dışarıdan Z canlısı (Y'nin doğal avcısı) dâhil ediliyor. Serada sıcaklık ve nemin 12 hafta boyunca sabit (%70 nem, 25°C) tutulduğu ölçülmüştür.

Deneyi yapan öğrenci, 12 haftalık ölçümler sonucunda Z canlısının sayısındaki büyük artışın, K canlısını doğrudan olumlu etkilediği sonucuna varıyor ve bunu raporluyor. Buna göre öğrencinin vardığı sonuç ve ekosistem dinamiği ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

- A) Öğrencinin sonucu K'nın fotosentez hızıyla doğrudan ilişkilidir, T'nin sayısının sabit kalması raporu destekler.
- B) Öğrenci yanılmaktadır; Z'nin artışı, Y'nin azalmasına neden olur ancak bu durum X üzerindeki avlanma baskısını azaltacağından X artar ve alt basamaktaki K canlısı hızla azalır.
- C) Öğrenci haklıdır; çünkü Z'nin artışı Y'yi azaltmış, bu da biyolojik birikimi azaltarak K'nın sayısını artırmıştır.
- D) Öğrenci yanılmaktadır; Z'nin artışı Y'yi azaltırken X'i artırır, X'in artması biyokütlenin K'ya ulaşmasını engeller.

7. (5 Puan)

Bir ekoloji araştırma istasyonu, sıcaklık ortalamasının 25°C, yıllık yağış miktarının 1200 mm olduğu izole bir ada ekosistemindeki besin zincirlerini 10 yıl boyunca gözlemlemiştir. Veriler, üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe enerjinin %10 kuralına uygun aktarıldığını, ancak ayrıştırıcı faaliyetlerinin her trofik düzeyde farklı yoğunlukta gerçekleştiğini göstermiştir.

Bir öğrenci, bir orman ekosistemindeki beş canlı türünden (K, L, M, N, P) oluşan ve ayrıştırıcıların da bulunduğu karmaşık bir besin ağını inceleyerek kendi oluşturduğu şu hipotezleri ileri sürüyor:

- I. P türünün ortamdan tamamen yok olması, üretici olan K türünün biyokütlesinde kesinlikle azalmaya yol açar.
- II. M türündeki biyolojik birikim L türünden fazlaysa, M türü enerji piramidinde L'ye göre güneş enerjisinden daha az pay almaktadır.
- III. Ayrıştırıcı mantar popülasyonunun aniden iki katına çıkması, ekosisteme giren toplam güneş enerjisi miktarını artırarak piramidin tabanını genişletir.
- IV. Eğer N türü hem bitkisel hem hayvansal besin tüketiyorsa, farklı besin zincirlerinde hem birinci hem de ikinci dereceden tüketici basamağında yer alıp farklı oranlarda enerji aktarımı alabilir.

Öğrencinin ekosistemdeki enerji ve madde akışı konusundaki değerlendirmelerinde hata yaptığı (yanlış olan) hipotezler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I ve II
- D) III ve IV

8. (5 Puan)

Biyosfer projeleri, ekosistem dengesini anlamak için kapalı sistemlerde yapılan bilimsel deneylerdir. Bu sistemlerde enerji döngüsü devam etse de dışarıdan madde girişi tamamen kapalıdır.

Kapalı bir ekosistem deneyi olan 'Biyosfer Z' projesinde, araştırmacılar sisteme üretici, tüketici ve ayrıştırıcı popülasyonları yerleştirmişlerdir. 6 ay sonra bitkilerin yapraklarında sararma, büyüme hızlarında yavaşlama tespit edilmiş ve atmosferdeki oksijen seviyesi beklenenden hızlı artmıştır. Ekosistemdeki toprağın pH değeri nötr olup ortam sıcaklığı 25°C'de sabit tutulmuştur. İncelemelerde topraktaki ölü organik madde miktarının hızla arttığı görülmüştür. Buna göre bu durumun nedeni ve sonucuna dair yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi bilimsel olarak doğrudur?

- A) Üreticiler çok hızlı fotosentez yaparak ortamdaki inorganik mineralleri tüketmiş, böylece ayrıştırıcıların organik maddeyi parçalaması için gerekli olan enerji ortadan kalkmıştır.
- B) Ayrıştırıcıların sayısındaki aşırı artış, topraktaki organik madde miktarını artırmıştır ve bu durum üreticilerin inorganik maddeye ulaşmasını engelleyerek madde döngüsünü durdurur.
- C) Ayrıştırıcı faaliyetlerinin durması veya çok azalması ölü atık birikimine yol açmış, inorganik maddeye dönüşüm durduğu için üreticiler ham madde yetersizliği yaşamıştır.
- D) Tüketicilerin hızla çoğalması sonucu ortamdaki oksijen seviyesi artmış, ayrıştırıcıların faaliyetleri baskılanarak inorganik mineral eldesi durmuştur.

9. (5 Puan)

Bir adadaki göl ekosisteminde yaşayan ve sadece birbirleriyle besin zinciri oluşturan P, R, S ve T canlı türleri üzerine bir araştırma yapılıyor. Beş yıllık izleme sonucunda elde edilen veriler şöyledir:

- Toplam biyokütlesi en fazla olan tür P, en az olan tür ise T'dir.
- S türünün biyokütlesi, R türünün biyokütlesinden fazladır.
- Ekosistemde yaşanan kuraklık döneminde ilk olarak P türünün üreme hızı düşmüş, ardından bu durum diğer türleri etkilemiştir.

(Araştırmacılar, türlerin yıllık göç verilerinin bu göl ekosistemi için sıfır olduğunu raporlamıştır.)

Araştırmacının ulaştığı sonuçlara göre, oluşturulan besin zinciriyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) S türünün ortamdaki tamamen yok olması durumunda, kısa vadede T türünün birey sayısında azalış, P türünün birey sayısında ise artış beklenir.
- B) Vücut büyüklükleri arasında $R > P > S$ ilişkisi varsa, bu durum klasik ekoloji piramidi kurallarıyla çelişen istisnai bir parazit besin zincirine işaret eder.
- C) P, R, S ve T türlerinden oluşan enerji piramidinde, güneş enerjisinden dolaylı olarak en az faydalanan grup T türüdür.
- D) Ekosisteme dışarıdan kimyasal bir kirletici eklendiğinde, dokularında birim kütle başına en az toksin bulunduran canlı türü P olmalıdır.

10. (5 Puan)

Sürdürülebilir kalkınma ve ekolojik denge, doğal madde döngülerinin bütünlüğüne bağlıdır. Döngülerden birinin kırılması, diğerlerini de doğrudan veya dolaylı olarak etkiler.

Bir ekolog ekibi, X bölgesinde kapalı bir ekosistem deneyi tasarlıyor. Deneyde şu adımlar gerçekleştiriliyor:

- Sisteme atmosferik serbest azot (N₂) ekleniyor, ancak toprakta nodül bulunduran hiçbir bitki ve bakteri türü dahil edilmiyor.
- Bölgedeki bitkilerin karbon tüketimini dengelemek için havaya yapay karbondioksit veriliyor.
- Tatlı su kaynaklarına sentetik fosfat bazlı gübre dökülüyor.
- Seralarda sıcaklık ve ışık şiddeti optimum düzeyde tutuluyor (25°C, yüksek ışık).

Üç ay sonra sistemdeki bitki popülasyonunun büyümesi duruyor ve su yüzeyi yeşil yosunlarla kaplanıp dip kısımlarda canlı ölümü gözleniyor.

Bu kapalı sistemin sürdürülebilir bir dengeye ulaşamamasının KÖK NEDENİ (başlangıç şartlarının analiziyle) aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sistemde azot bağlayıcı canlıların olmaması nedeniyle üreticiler nitrata erişememiş, sentetik gübre ise suda aşırı alg artışına yol açarak oksijeni tüketmiştir.
- B) Serbest azot gazının sisteme doğrudan verilmesi bitkileri zehirlemiş ve karbon döngüsünün tersine dönmesine neden olmuştur.
- C) Sıcaklığın 25°C'de sabit tutulması, bitkilerin terlemeyle su kaybetmesine ve su döngüsünün yavaşlamasına neden olmuştur.
- D) Havaya yapay karbondioksit verilmesi, sera etkisini beklenenden fazla artırmış ve bitkilerin solunumunu tamamen durdurmuştur.

11. (5 Puan)

Bilim insanları Dünya dışında yaşam alanları oluşturmak için kapalı biyosfer modelleri tasarlamaktadır.

Kapalı bir biyosfer simülasyonunda yapılan bir deneyde, ortama yalnızca fotosentetik bakteriler, otçul böcekler, etçil böcekler ve bazı parazit türleri konulmuştur. Sisteme belirli aralıklarla sabit miktarda organik atık (ölü yapraklar) eklenmektedir. Birkaç hafta sonra sistemdeki oksijen ve karbondioksit oranlarının sürekli düştüğü, bitki gelişiminin durduğu ve topraktaki organik atık kütlesinin sürekli arttığı gözlemlenmiştir. Bir araştırmacı bu durumu, 'Ortamda yeterli nem olmamasına ve bitkilerin topraktaki inorganik tuzları çekmesine' bağlamıştır.

Araştırmacının bu çıkarımıyla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

- A) Çıkarım yanlıştır; asıl sorun organik atıkları inorganik maddelere dönüştürecek saprofit (ayrıştırıcı) canlıların ortama eklenmemesi, bu nedenle karbon ve azot döngülerinin tıkanmasıdır.
- B) Çıkarım doğrudur; topraktaki inorganik tuzlar tükenince bitkiler ölmüş ve karbon döngüsü durmuştur.
- C) Çıkarım yanlıştır; sorunun temel nedeni ortamda nem olmaması değil, amonyağı nitrata dönüştüren kemosenetik bakterilerin eksikliğidir.
- D) Çıkarım doğrudur; ortama daha fazla otçul böcek eklenirse atıklar doğrudan enerji piramidine geri döner ve döngü düzelir.

12. (5 Puan)

Bir ekosistemde bulunan farklı canlı gruplarının biyokütle, enerji miktarları ve beslenme ilişkileri bilimsel bir araştırmaya konu olmuştur.

Bir öğrenci, kapalı bir ekosistem modelinde X, Y, Z ve T canlı türlerinin popülasyonlarındaki enerji değişimlerini gözlemlemiştir. Modele sadece güneş ışığı ve periyodik olarak sabit miktarda su verilmiştir. Gözlem sürecinde X türünde görülen %10'luk biyokütle artışının ardından, sırasıyla Y türünde de biyokütle artışı başlamış, ancak T türünün toplam enerjisinin en fazla olduğu ve tüm canlı gruplarının atıklarında bulunduğu tespit edilmiştir. Z türü, Y türü üzerinden beslenmekte ve vücut sıcaklığını ortam sıcaklığından bağımsız tutabilmektedir. Ekosistemde ayrıca inorganik madde döngüsünün hızının, T türünün faaliyetine bağlı olarak arttığı belirlenmiştir. Bir araştırmacı bu durumu 'Z türü üreticidir çünkü en son tüketilen gruptur ve tüm enerjiyi toplamıştır' diyerek yanlış yorumlamıştır. Buna göre, ekosistemdeki enerji akışı ve madde döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi bu bilimsel veriler ve ilişkilerle çelişen bir çıkarımdır?

- A) Z türünün sayısının aşırı artması durumunda X türünün biyokütlesi başlangıçta artış gösterebilir.
- B) T türü ekosistemdeki besin piramidinin her basamağından enerji akışı sağlayan ayrıştırıcılardır.
- C) Güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren X türünden Y türüne aktarılan enerji, Y'den Z'ye aktarılandan fazladır.
- D) T türü biyolojik birikimin en az olduğu, organik atıkları inorganik maddelere çeviren gruptur.

13. (5 Puan)

Kirlilik ve Besin Piramidi Analizi

Bir araştırmacı, kirliliğin yoğun olduğu bir kapalı göl ekosistemindeki beş farklı canlı türünü (K, L, M, N, P) incelemektedir. Araştırmacı bu türlerin dokularındaki ortalama cıva (ağır metal) birikimini ve popülasyonlarının toplam biyokütlerini ölçmüş, ancak sonuçları analiz ederken iki farklı verinin birbirine uymadığını fark etmiştir.

Veriler şöyledir:

- Dokulardaki cıva birikimi (ppm): K: 0.05, L: 8.2, M: 0.4, N: 15.6, P: 1.8
- Toplam Biyokütle (ton): K: 500, L: 10, M: 80, N: 400, P: 35

Ekosistem dengesinde olan ve bu gölde tek bir besin zinciri oluşturan bu canlıların dizilimi (üreticiden son tüketiciye) incelendiğinde, araştırmacının ölçümlerinden birinde kesinlikle hata olduğu sonucuna varılıyor.

Araştırmacının ulaştığı bu sonucun nedeni ve hatalı ölçümün yapıldığı veri seti hangi seçenekte en doğru şekilde açıklanmıştır?

- A) Besin piramidinde yukarı çıkıldıkça hem aktarılan enerji hem de zehirli madde birikimi azalmalıdır; biyokütle değerleri doğrudur, cıva verileri hatalıdır.
- B) P türünün biyokütlesinin L türünden yüksek olması enerji akışına aykırıdır; enerji aktarımı azaldığından P'nin biyokütlesi verilerde hatalı ölçülmüştür.
- C) Biyolojik birikim ile canlıların trofik düzeyleri ters orantılıdır; bu nedenle cıva birikimi ölçümlerinde hata yapılmıştır ve K türü en üst tüketici olmalıdır.
- D) Besin zincirinde zehirli madde birikimi arttıkça toplam biyokütlenin azalması beklenir; N türünün biyokütlesi çok yüksek bulunduğundan biyokütle ölçümleri hatalıdır.

14. (5 Puan)

Doğadaki ekosistemlerde azot ve karbon gibi elementlerin sürekli dönmesi, karmaşık biyolojik, kimyasal ve fiziksel süreçlerle gerçekleşir. Bu döngülerde her canlı grubu spesifik kimyasal dönüşümlerde rol oynar.

Bir araştırmacı kapalı bir ekosistemde azot döngüsünü incelemek için bir model kurmuştur. Modeldeki dört farklı toprak bölgesinde ölçülen mikrobiyal faaliyetler tabloda verilmiştir:

Toprak Bölgesi	Gözlemlenen Ana Dönüşüm	Topraktaki Toplam Organik Madde (1 Ay Sonra)
Bölge X	$\text{NH}_3 \rightarrow \text{NO}_3^-$	Sabit
Bölge Y	$\text{N}_2 \rightarrow \text{NO}_3^-$	Artmış
Bölge Z	Ölü organizma proteinleri $\rightarrow \text{NH}_3$	Hızla azalmış
Bölge W	$\text{NO}_3^- \rightarrow \text{N}_2$	Sabit

Araştırmacının laboratuvar asistanı, ekosisteme dökülen yaprakların hızla ayrışıp toprağa kazandırılmasından sorumlu olan canlıların W bölgesinde bulunduğunu ve bu canlıların havadaki azot gazını artırdığını rapor etmiştir.

Asistanın bu değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Rapor hatalıdır; yaprakları parçalayanlar Y bölgesindeki azot bağlayıcı bakterilerdir, W bölgesi ise üretici bitkilere aittir.
- B) Asistanın raporu tamamen doğrudur; ayrıştırıcılar W bölgesinde faaliyet göstererek topraktaki fazla nitrata havaya azot gazı olarak geri verir.
- C) Rapor hatalıdır; asistan, X bölgesindeki nitrifikasyon sürecini ayrıştırıcıların temel faaliyetiyle karıştırmıştır.
- D) Rapor hatalıdır; yaprakların parçalanarak madde döngüsüne katılması işlemi Z bölgesinde gerçekleşir ve asistan, denitrifikasyon olayı ile ayrıştırıcı faaliyetini birbirine karıştırmıştır.

15. (5 Puan)

Bir araştırmacı, tarım ilaçlarıyla kirlenmiş kapalı bir tatlı su ekosisteminde yaşayan K, L, M ve N türlerini inceliyor. Türlerin ortalama vücut büyüklükleri ve bazı özellikleri şöyledir:

- K: Suda çözünmüş zehirli madde oranı en düşük olan türdür ve kloroplast taşır.
- L: Sadece K türü ile beslenir, vücut sıcaklığı çevreye göre değişir.
- M: L türü ile beslenir ve dokularındaki ağır metal konsantrasyonu en yüksek olanıdır.
- N: K, L ve M türlerinin organik atıklarını hücre dışı sindirimle parçalayarak ortama inorganik tuzlar bırakır.

Bir öğrenci bu verileri kullanarak bir ekoloji piramidi çizmiş ve türleri tabandan yukarıya doğru sırasıyla N → K → L → M şeklinde yerleştirmiştir.

Bu veriler ve öğrencinin oluşturduğu piramit dikkate alındığında, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi bilimsel olarak doğrudur?

- A) Piramitte enerjinin akış yönü tabandan tavana doğru azaldığı için K türünün aktardığı enerji M türünün aktardığı enerjiden düşüktür, bu yüzden K en üstte yer almalıdır.
- B) Öğrenci K'yi tabana koyarak doğru bir başlangıç yapmıştır ancak M'nin toplam biyokütlesi L'den fazla olamayacağı için M ile L'nin yerini değiştirmelidir.
- C) Öğrencinin dizilimi biyolojik birikim kurallarına uygundur; ancak ekosisteme L ile beslenen yeni bir tür girerse M türündeki biyolojik birikim zamanla azalır.
- D) Öğrenci dizilimi yaparken N türünün ekolojik rolünü yanlış yorumlamıştır; N türü üretici değil, inorganik madde döngüsünü sağlayan ayrıştırıcıdır ve piramidin her basamağında yan tarafta gösterilmelidir.

16. (5 Puan)

Bir öğrenci, özel bir serada 'Üretici Bitki -> Otçul Böcek -> Örümcek -> Böcekçil Kuş' şeklinde ilerleyen bir besin zincirini incelemektedir. Sistemdeki sulama suyuna yanlışlıkla doğada çözünmeyen ve canlı dokularına bağlanan bir miktar ağır metal karışmıştır. Ortamdaki bitkilerin toplam biyokütlesi başlangıçta 10.000 kg olarak ölçülmüştür. Öğrenci bu verileri kullanarak şu tahminde bulunur: 'Sistemdeki enerji sürekli olarak kuşa doğru aktığı için en üst basamaktaki böcekçil kuş en yüksek toplam enerjiye sahip olacaktır. Ağır metal ise her beslenme basamağındaki canlıların biyokütlesi içinde dağılıp parçalanacağı için kuşa en düşük yoğunlukta (seyreltilmiş olarak) bulunacaktır.' Öğrencinin ekosistem modeli üzerine yaptığı bu tahmini değerlendiren en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Enerji tahmini hatalı, metal derişimi tahmini ise doğrudur; çünkü ağır metaller üst basamaklara geçerken seyreltilerek metabolik atıklarla dışarı atılır.
- B) Her iki tahmini de hatalıdır; üst beslenme basamaklarına çıkıldıkça yaşamsal faaliyetler nedeniyle aktarılan toplam enerji azalırken, dokularda biriken ağır metal derişimi artar.
- C) Her iki tahmini de doğrudur; çünkü üst basamaklara doğru organizmanın vücut büyüklüğü arttığı için biriken toplam enerji en üst seviyeye ulaşır.
- D) Enerji tahmini doğru, metal derişimi tahmini hatalıdır; enerji birikerek aktarıldığı için üst basamakta en fazladır, zehirli maddeler ise her basamakta eşit oranda kalır.

17. (5 Puan)

Bir ekoloji araştırmacısı, dış ortamdan tamamen yalıtılmış ve sadece ışık geçiren dev bir cam fanus içine toprak, bir miktar su ve üç farklı canlı türü yerleştirerek kapalı bir ekosistem modeli oluşturuyor. Fanusa sadece üretici (K), otçul (L) ve etçil (M) türlerinden eşit sayıda birey konuyor ve ortam sıcaklığı sensörlerle 25°C'de sabit tutuluyor. Araştırmacı, sistemdeki K canlılarının başlangıç biyokütlesinin yaklaşık 10.000 J'lük enerjiye eşdeğer olduğunu ve %10 kuralı gereği L türüne yaklaşık 1.000 J'lük enerjinin başarıyla aktarılabilceğini hesaplıyor.

Bir araştırmacı, fanustaki canlı yaşamının kendi kendini uzun süre devam ettireceği hipotezini kurmuştur ancak ekosistem birkaç ay içinde tamamen çökmüştür. Buna göre, araştırmacının deney tasarımındaki en temel hata ve bu durumun yol açtığı sonuç aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

- A) Sadece ışık girişinin olduğu kapalı ortamlarda otçul ve etçil canlıların oksijen tüketimi, üreticinin oksijen üretiminden her zaman fazla olacağı için sistemdeki gaz dengesi tersine dönmüştür.
- B) Sıcaklığın 25°C'de sabit tutulması, üst basamaklara çıkıldıkça artan biyolojik birikimi (zehir miktarını) hızlandırmış ve sistemdeki en üst tüketici olan M canlısının yok olmasına neden olmuştur.
- C) K canlısından L canlısına aktarılabilecek enerjiyi 1.000 J değil, %10 kuralına göre sadece 100 J olarak hesaplamalıydı; enerji yetersizliği yüzünden tüketiciler hayatta kalamamıştır.
- D) Sisteme inorganik madde döngüsünü sağlayacak ayrıştırıcı bir tür eklenmemiştir; topraktaki mineraller tükenince üreticiler fotosentez yapamamış ve besin zinciri temelinden çökmüştür.

18. (5 Puan)

Sürdürülebilir kalkınma ve ekolojik dengenin sağlanması, doğadaki madde döngülerinin dış müdahaleye gerek kalmadan kendi kendine devam edebilmesine bağlıdır.

Bir uzay ajansı araştırmacısı, kurulacak bir araştırma üssü için kapalı ve sürdürülebilir bir biyosfer tasarlamaktadır.

Başlangıç tasarımı: Kapalı sisteme yüksek oksijen üreten bitkiler yerleştirilmiş, sabit 25°C sıcaklık sağlanmış ve topraktaki nem oranı %60'ta sabit tutulmuştur. Sistemi 6 ay gözlemleyen araştırmacı şu verileri elde etmiştir:

1. Ortamdaki karbondioksit gazı tamamen tükenme noktasına gelmiştir.
2. Bitkiler büyüme evresini durdurmuştur.
3. Toprak yüzeyinde kurumuş yaprak ve kök kalıntıları birikmiş, ancak toprağın derinliklerindeki mineral miktarı sifirleşmiştir.

Bu durumu çözmek isteyen araştırmacı, sisteme dışarıdan düzenli olarak inorganik sıvı gübre ve karbondioksit gazı pompalanmasını sağlayan otonom bir sistem ekleyerek bitkilerin yeniden büyümesini sağlamıştır.

Madde döngüleri ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri dikkate alındığında, araştırmacının uyguladığı bu çözüm yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi en doğru değerlendirmedir?

- A) Sıvı gübre takviyesi topraktaki mineral döngüsünü başarıyla tamamladığı için sürdürülebilirdir; ancak karbondioksit eksikliğini gidermek için ortama tüketici canlıların eklenmesi gerekirdi.
- B) Kapalı sistemlerde üreticilerin tek başına yaşaması imkansız olduğundan gaz ve mineral takviyesi doğru bir uygulamadır; sıcaklığın ve nemin sabit tutulması ekolojik dengenin sürdürülebilirliği için yeterlidir.
- C) Kurumuş yaprakların birikmesi sistemin enerji miktarını artırdığı için avantajlıdır; çözüm olarak sadece karbondioksit pompalanması sürdürülebilir yaşamı desteklemek için en uygun tasarımıdır.
- D) Dışa bağımlılığı sürekli hale getirdiği için sürdürülebilirlik ilkesine aykırıdır; asıl sorun sisteme ölü atıkları parçalayarak karbondioksit ve mineral üretecek ayrıştırıcıların dahil edilmemesidir.

19. (5 Puan)

Bir göl ekosisteminde birbirleriyle beslenme ilişkisi bulunan (tek bir besin zinciri oluşturan) K, L, M ve N türlerinin dokularındaki ortalama DDT (zehirli tarım ilacı) birikim miktarları ve ortamda tercih ettikleri su derinlikleri ölçülmüştür. Sonuçlar şu şekildedir:

- K türü: 0.03 ppm DDT (Yüzeye yakın)
- L türü: 18.5 ppm DDT (Orta derinlik)
- M türü: 2.8 ppm DDT (Derin dip suları)
- N türü: 0.45 ppm DDT (Orta derinlik)

Verileri inceleyen öğrenci Ayşe, "Canlıların yaşadığı su derinliği arttıkça, besin zincirinde daha üst basamaklara çıkılır ve buna bağlı olarak dokulardaki zehir birikimi artar" hipotezini kurmuştur.

Öğrenci Ayşe'nin hipotezi ve göldeki besin zinciri dinamikleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi bilimsel olarak doğrudur?

- A) Ekosisteme M canlısıyla beslenen ve hızla çoğalan yeni bir avcı tür girdiğinde, K canlısının popülasyon yoğunluğunda doğrudan bir artış yaşanması beklenir.
- B) M canlısının toplam biyokütlesi N canlısınınkinden daha fazla olduğu için, M canlısı üzerinden L canlısına çok daha yüksek oranda enerji ve DDT aktarımı gerçekleşir.
- C) K canlısından L canlısına doğru aktarılan enerjinin giderek azalmasının temel nedeni, her basamaktaki canlıların kendi yaşamsal faaliyetleri (solunum vb.) için enerji harcamasıdır.
- D) Ayşe'nin hipotezi doğrudur çünkü besin piramidinin en üstündeki canlı her zaman en derin sularda yaşar ve zehirli maddeyi sudan doğrudan emerek depolar.

20. (5 Puan)

Kapalı bir uzay üssü prototipinde (Biyo-Alan) kendi kendine yeten, tamamen sürdürülebilir bir tarım ve yaşam ekosistemi tasarlanmıştır. Ortamda düzenli çalışan güneş panelleriyle ışık ihtiyacı karşılanmakta ve kurulan kapalı sistemle su döngüsü kusursuz işlemektedir. Ancak 3. yıldan itibaren topraktaki azotlu bileşiklerin ve inorganik tuzların miktarının hızla düştüğü, bitki (üretici) veriminin durma noktasına geldiği ve toprak yüzeyinde kuruyan bitki/yaprak kalıntılarının hiçbir değişime uğramadan dağ gibi biriktiği saptanmıştır. Proje mühendisleri, düşen verimi düzeltmek amacıyla ışık süresini uzatmış ve ortama yapraklarla beslenen yeni böcek türleri ilave etmiştir. Buna rağmen biyo-alan kısa sürede tamamen çökmüştür.

Buna göre, projenin sürdürülebilirlik ilkelerine aykırı olarak çökmesine neden olan temel bilimsel hata ve sistemin onarılması için gereken en kritik hamle aşağıdakilerin hangisinde doğru değerlendirilmiştir?

- A) Organik atıkları yeniden inorganik ham maddelere dönüştüren canlıların eksikliği madde döngüsünü kırmıştır; sürdürülebilirliği sağlamak için toprağa saprofit (ayrıştırıcı) mantar ve bakteriler eklenmeliydi.
- B) Enerji akışının bitki kalıntılarında tıkanması temel sorundur; artan organik atıkları hızlıca tüketip madde döngüsünü hızlandırmak için ortama otçul (birincil tüketici) böceklerin sayısı artırılmalıydı.
- C) Yapay su döngüsü ve ışık miktarının fotosentez için yetersiz kalması kriz yaratmıştır; topraktaki inorganik miktarını dert etmeden fotosentez hızını artırmak için ortama ekstra karbondioksit pompalanmalıydı.
- D) Güneş panellerinin sağladığı yapay ışığın besin zincirindeki aktarımı verimsiz olmuştur; üreticilere doğrudan kimyasal enerji sağlamak için sisteme sentetik gübreler ve mineral ilaçları dahil edilmeliydi.

21. (5 Puan)

Bir biyolog, çevre koşullarının madde döngüsü üzerindeki etkisini incelemek için başlangıçta eşit miktarda (50 g) aynı tür organik atık içeren dört kap hazırlıyor. K ve L kaplarına eşit miktarda azot, M ve N kaplarına eşit miktarda fosfor ekleniyor (Bu minerallerin ayrıştırıcı türlerine özel bir etkisi olmadığı biliniyor). 30 gün sonra şu veriler elde ediliyor:

K kabı: 25°C, %70 nem, Bakteri, 10g atık kaldı.

L kabı: 25°C, %70 nem, Ayrıştırıcı yok, 48g atık kaldı.

M kabı: 10°C, %20 nem, Mantar, 25g atık kaldı.

N kabı: 10°C, %70 nem, Mantar, 5g atık kaldı.

Bir öğrenci, tablodaki verilere dayanarak şu çıkarımı yapmıştır: 'Ortam sıcaklığının 25°C'den 10°C'ye düşmesi, her koşulda ayrıştırıcı faaliyetini yavaşlatır. Bu yüzden M ortamındaki kalan madde miktarı K'dan fazladır.' Öğrencinin bu çıkarımındaki bilimsel hata aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

- A) Sıcaklığın etkisini analiz ederken, nem oranının da farklı (K:%70, M:%20) olduğunu göz ardı etmesi.
- B) Kalan organik madde miktarı azaldıkça döngü hızının arttığını yanlış yorumlaması.
- C) Sıcaklığın etkisini ölçmek için farklı ayrıştırıcı türlerinin kullanıldığı ortamları (K ve M) karşılaştırması.
- D) L ortamındaki verileri hesaba katmadan sadece ayrıştırıcı ortamlara odaklanması.

22. (5 Puan)

Kapalı ekosistemlerde canlılar arası etkileşim, enerji akışı ve madde döngüsü ile doğrudan bağlantılıdır. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı ilişkileri incelenirken laboratuvar verileri kullanılır.

Aşağıdaki tabloda kapalı bir ekosistemden izole edilen K, L, M ve N canlı türlerinin belirli ortamlardaki üreme davranışları incelenmiş ve 10 günlük periyottaki sayısal değişimleri (birey/litre) kaydedilmiştir. Tablo dışındaki bir veri olarak, ortamın sıcaklığı sabit 25°C tutulmuştur.

Ortam Şartları	K canlısı değişimi	L canlısı değişimi	M canlısı değişimi	N canlısı değişimi
Sadece Işık ve İnorganik Madde	Hızla artar	Giderek azalır, yok olur	Giderek azalır, yok olur	Giderek azalır, yok olur
K, L, N canlıları birlikte (Aydınlık)	Sabit kalır	Azalır	-	Artar
Karanlık ortam + Bol Organik Atık	Giderek azalır	Artar	Hızla artar	Azalır

Bir araştırmacı, bu tabloya ve madde döngüleri bilgisine dayanarak şu modeli çiziyor: 'K canlısı besin zincirinin temelini oluşturur. Enerji, K'den L ve N'ye doğru akar. M canlısının faaliyeti sonucunda açığa çıkan maddeler doğrudan K canlısının kullanımına sunulur. Eğer ortama sadece N ve L konulursa, N canlısı bir süre yaşayabilir çünkü L canlısını tüketebilir.'

Buna göre araştırmacının kurduğu modelle ilgili hangi değerlendirme kesinlikle yanlıştır?

- A) N ve L'nin birlikte bulunduğu ortamda N'nin artıp L'nin azalması, enerji akışının kesinlikle L'den N'ye doğru olduğunu gösterir.
- B) K canlısı üreticidir çünkü sadece inorganik madde ve ışıqla üreyebilmektedir; karanlık ortamda organik atık olsa bile azalması fotosentez yaptığını gösterir.
- C) İkinci deneyde L canlısının azalması, N canlısının L üzerinden beslenen bir etçil veya L'nin hastalık yapıcı paraziti olduğunu kanıtlar.
- D) M canlısı ayrıştırıcıdır ve karanlıkta organik atıkları parçalayarak amonyak gibi inorganik maddeleri K'nın kullanımına sunar.

23. (5 Puan)

Ekosistemlerde madde döngüsü ve enerji akışı yaşamın devamlılığını sağlar. Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren besin zincirlerinde, organizmalar aldıkları enerjinin bir kısmını yaşamsal faaliyetleri için kullanırken bir kısmını ısı olarak çevreye verir, geri kalanını ise bir üst basamağa aktarırlar.

Bir araştırmacı, dış ortamdan yalıtılmış bir ekosistemdeki canlıların (X, Y, Z, T ve W) dokularındaki toksik madde birikim oranlarını ölçerek X canlısının üretici, Z, Y ve T'nin ise sırasıyla tüketici basamaklarında olduğunu, W canlısının ise ayrıştırıcı olarak görev yaptığını belirliyor. Araştırma sırasında bitkilerin topraktan aldığı su miktarı ve W canlısının solunum hızı da veri olarak kaydediliyor. Ekosistemin Güneş ışığı alması tamamen engellendiğinde bir öğrenci şu iddiada bulunuyor: 'Güneş enerjisi kesilse bile, W canlısı ekosistemdeki tüm organik atıkları parçalayarak elde ettiği enerjiyi besin zincirine temelden geri kazandırır. Böylece W canlısı üretici konumuna geçerek enerji akışının W → Z → Y → T şeklinde kesintisiz devam etmesini sağlar.' Öğrencinin kurduğu bu modelin ekolojik açıdan hatalı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Besin zincirinde Güneş enerjisi olmadan da yaşamın devam edebilmesi için W canlısının yalnızca Z canlısının atıklarını kullanmak zorunda kalması.
- B) Ayrıştırıcıların madde döngüsünü sağlayıp atıkları inorganik maddelere dönüştürebilmesine rağmen, ekosisteme yeni enerji girişi yapamaması ve enerjinin geri dönüşümsüz olarak kullanılıp ısıya dönüşmesi.
- C) Enerji akışının her zaman tüketicilerden üreticilere doğru tek yönlü olması ve ayrıştırıcıların sadece üst basamaklardaki enerjiyi üretebilmesi.
- D) W canlısının organik atıkları parçaladığında açığa çıkan enerjiyi X canlısına değil, dokusunda en çok toksik madde biriken T canlısına aktarmak zorunda olması.

24. (5 Puan)

Bir arařtırmacı; kapalı bir cam fanusta ıřık miktarının, nemin ve sıcaklıęın optimum seviyede sabit tutulduęu kontrollü bir ekosistem kuruyor. Ekosistemde ototrof bitkiler, otçul böcekler, etçil örümcekler ve toprak bulunmaktadır. Arařtırmacı deneyin bir aşamasında topraęa, sadece mantar ve bakterileri tamamen yok ettięi bilinen spesifik bir kimyasal madde ekler. Sonraki birkaç hafta boyunca bitkilerin ıřığa ve suya erişiminde bir kısıtlama olmamasına rağmen bitki gelişiminin tamamen durduęu, oksijen üretiminin hızla azaldıęı ve yüzeyde ölü organizma kalıntılarının biriktięi ölçülür. Durumu analiz eden bir öęrenci, 'Kimyasal madde bitkilerin kloroplastlarına zarar vererek fotosentezi durdurmuştur.' hipotezini öne sürer, ancak bu tespitin kimyasalın özellikleri göz önüne alındığında yanlış olduęu kanıtlanır.

Arařtırmacının ulařtıęı sonuçlar ve öęrencinin hatalı varsayımı dikkate alındığında, bitki gelişiminin durmasının asıl nedeni ařaęıdakilerden hangisidir?

- A) Sistemde sadece üretici ve tüketicilerin kalmasının enerji akışını bozarak organik madde yıkımını aniden ve tamamen durdurması.
- B) Kimyasalın ayrıştırıcıları yok etmesi sonucu, sistemdeki organik atıkların inorganik maddelere dönüşmemesi ve üreticilerin inorganik madde eksikliği çekmesi.
- C) Ayrıştırıcıların yok olmasıyla topraktaki inorganik tuz oranının aşırı artarak bitki köklerinin su emilimini durdurması.
- D) Tüketici popülasyonunun ürettięi inorganik maddelerin kimyasal madde tarafından bağlanarak üreticilerin fotosentez yapmasını doğrudan engellemesi.

25. (5 Puan)

Bir arařtırma ekibi, gelecekte uzayda kurulacak sürdürülebilir kolonileri modellemek için Dünya'da tamamen dıřa kapalı, řeffaf bir 'biyoküre' inşa ediyor. Sisteme sadece güneş ıřığı girebilmektedir. Biyoküreye başlangıçta hesaplanmış miktarda toprak, su göleti, çeřitli üretici bitkiler, otçul böcekler ve nemi koruması için 5 cm kalınlığında özel bir UV filtreli cam eklenmiştir. İlk 3 ay boyunca bitkilerin hızla büyüdüęü ve oksijen seviyesinin dengede kaldıęı gözlemleniyor. Ancak 6. aya gelindiğinde atmosferdeki karbondioksit (CO₂) miktarının kritik seviyede azaldıęı, bitki büyümesinin durduęu ve toprak yüzeyinde ölü bitki örtüsü ile böcek atıklarının giderek biriktięi tespit ediliyor. Ekip, kurulan mekanik sulama sisteminin günde tam 10 litre su döngüsü sağladığını ve sistemde su eksięi olmadığını doğruluyor.

Biyoküredeki madde döngüsünün tıkanmasına ve sürdürülebilirlięin bozulmasına neden olan asıl problem ve ekosistemi kurtarmak için yapılması gereken en uygun müdahale ařaęıdakilerden hangisinde doğru analiz edilmiştir?

- A) Ayrıştırıcı organizmaların yetersizlięi nedeniyle organik atıklardaki karbon atmosfere geri dönememiştir; topraęa uygun çürükçül türler aşılanmalıdır.
- B) Bitkiler fotosentezde mevcut karbondioksiti çok hızlı tüketmiştir; cam yüzey karartılarak ıřık miktarı azaltılmalı ve büyüme hızı düşürülmelidir.
- C) Kapalı sistemde topraktaki azot ve mineraller tamamen tükendięi için sistem çökmüştür; sürdürülebilirlięi sağlamak adına dıřarıdan kimyasal gübre takviyesi yapılmalıdır.
- D) Tüketici canlı sayısının az olması karbon döngüsünü yavaşlatmıştır; ortama daha fazla otçul ve etçil hayvan eklenerek sistem dengelenebilir.

26. (5 Puan)

Sürdürülebilir kalkınma; ekonomik hedeflere ulaşırken doğanın kendi kendini yenileme kapasitesinin, madde döngülerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını merkeze alan çok boyutlu bir yaklaşımdır. Karar alma süreçlerinde, bir alanın kısa vadeli ekonomik potansiyeli ile o alanın sunduğu uzun vadeli ekosistem hizmetleri (su döngüsü, karbon yutağı vb.) arasında denge gözetilmelidir.

Karya Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla 'Yeşil Kent' eylem planını açıklamıştır. Planda şu uygulamalar ve beklenen sonuçlar yer almaktadır: 1. Sokak aydınlatmalarında tamamen güneş enerjisine geçilmesi (Beklenen: Fosil yakıt tasarrufu). 2. Bölgedeki geniş bataklık alanın kurutulması organik tarım arazisine dönüştürülmesi (Beklenen: Yerel halk için %40 ekonomik gelir artışı). 3. Evsel atıkların zorunlu geri dönüşüm programına alınması (Beklenen: Yeni ham madde ihtiyacında azalma). 4. Tüm kent sakinlerine ücretsiz yüksek hızlı fiber internet sağlanması (Beklenen: Sosyal iletişimin artması). Bir çevre bilimci, belediyenin bu planının kısa vadede faydalı görünse de 'sürdürülebilir kalkınma ve ekolojik denge' ilkeleriyle temelden çelişen bir uygulama içerdiğini belirterek projeye itiraz etmiştir. Buna göre, bilim insanının itiraz ettiği uygulama ve haklı gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 1. uygulamada yalnızca yenilenebilir enerjiye güvenilmesi, enerji aktarımında kesintilere yol açarak ekosistemdeki enerji akışını yavaşlatır.
- B) 3. uygulama ile azalan ham madde ihtiyacı, üretim faaliyetlerini durduracağı için ekolojik dengenin korunmasına rağmen ekonomik sürdürülebilirliği tehlikeye atar.
- C) 2. uygulamada bataklığın kurutulması ekonomik kazanç sağlasa da, bölgedeki madde döngülerini ve biyolojik çeşitliliği geri dönülemez şekilde yok ederek uzun vadeli sürdürülebilirliği engeller.
- D) 4. uygulamanın ekolojik dengeden ziyade sadece sosyal bir yatırım olması, projenin sürdürülebilir çevre bütünlüğünü bozar.

27. (5 Puan)

Araştırmacılar, madde döngülerini incelemek amacıyla tamamen kapalı, dışarıdan sadece ışık ve ısı geçiren dev bir cam fanus (mezokozm) tasarlamışlardır. Fanusun içine nemli toprak, üretici bitkiler, otçul böcekler ve etçil böcekler konulmuştur. Başlangıçta bitkilerin adaptasyonu için toprağa bir miktar inorganik kimyasal gübre eklenmiştir. Ancak kurulum sırasında toprağın yanlılıkla tamamen sterilize edildiği (tüm mantar ve bakterilerden arındırıldığı) unutulmuştur.

İlk 4 hafta bitki kütlesi artmış, oksijen seviyesi yükselmiş ve topraktaki ölü yapraklar ile böcek kalıntıları birikmeye başlamıştır. 5-8. haftalarda ise dışarıdan su ve ışık sağlanmasına rağmen bitki gelişimi tamamen durmuş, karbondioksit seviyesi kritik düzeyin altına inmiştir. Bir öğrenci, 'Ekosistemde fotosentez hızı solunum hızını geçtiği için karbondioksit tükendi. Sistemi kurtarmak için ortama daha fazla otçul böcek eklenmeli ki solunumla üretilen karbondioksit artsın' şeklinde bir hipotez kuruyor. Öğrencinin hipotezi ve bu sistemdeki temel sorun göz önüne alındığında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi bilimsel olarak en geçerlidir?

- A) Öğrencinin hipotezi hatalıdır; bitki gelişiminin durma nedeni, ölü atıkları parçalayarak inorganik maddeleri ve karbondioksidi doğaya geri döndürecek ayrıştırıcı canlıların sistemde bulunmamasıdır.
- B) Öğrencinin hipotezi hatalıdır; sistemdeki çöküşün asıl sebebi toprağa eklenen kimyasal gübrenin bitkiler tarafından fotosentezde tüketilmesi ve gübre eksikliğinden dolayı oksijen üretiminin durmasıdır.
- C) Öğrencinin hipotezi doğrudur; otçul tüketici sayısının artırılması hem ortamdaki karbondioksit oranını yükseltir hem de topraktaki böcek kalıntılarını doğrudan tüketerek madde döngüsünü sağlar.
- D) Öğrencinin hipotezi doğrudur; otçul böceklerin solunumla ürettiği enerji doğrudan bitkilerin büyümesini tetikler, böylece biriken organik atıkların oluşturduğu toksik etki ortadan kalkar.

28. (5 Puan)

Bir biyolog, kapalı bir göl ekosistemine fabrika atıklarından sızan bir ağır metalin, aynı besin zincirini oluşturan X, Y, Z ve T canlı türlerinin dokularındaki ortalama birikim oranlarını ve bu türlerin ortalama yaşam sürelerini ölçerek aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır.

Canlı Türü	Dokulardaki Ağır Metal Oranı (ppm)	Ortalama Yaşam Süresi
X	0,04	2 ay
Y	12,50	4 yıl
Z	2,80	1 yıl
T	0,35	6 ay

Bir süre sonra göle, sadece Z türü ile beslenen yeni bir istilacı W türü kazara karışır. İstilacı tür hızla üreyerek Z popülasyonu üzerinde büyük bir av baskısı oluşturur.

Buna göre, istilacı W türü ekosisteme dâhil olup çoğaldıktan bir süre sonra meydana gelecek değişimlerle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi bilimsel olarak doğrudur?

- A) Z türü üzerinden aktarılan enerji azalacağından, enerji piramidinin kuralları gereği ekosistemdeki zehirli maddenin tamamı W türünde birikmeye başlar.
- B) Yeni türün Z'yi tüketerek sayısını azaltması, zamanla dokularında en az biyolojik birikim gözlenen X türünün ekosistemdeki toplam miktarının azalmasına yol açar.
- C) Z türünün birey sayısı azalacağından T türü üzerindeki av baskısı düşer, T'nin artmasıyla üretici olan X türünün de birey sayısı ve biyokütlesi artış gösterir.
- D) Y türünün yaşam süresi en uzun olduğu için çevresel değişimlere karşı en dirençli olanıdır; Z azalırsa Y türü ihtiyaç duyduğu enerjiyi doğrudan T türünden karşılar.

29. (5 Puan)

Bir araştırmacı, hava sızdırmaz cam bir fanus içine özel olarak sterilize edilmiş (tüm mantar ve çürükçül bakterilerden tamamen arındırılmış) toprak, bir miktar su, canlı bitki (üretici), otçul böcekler (tüketici) ve yalnızca havadaki serbest azotu toprağa bağlayan bakteriler koyarak yapay bir ekosistem kuruyor. İlk etapta fotosentez hızını yüksek tutmak için fanus içine ekstra karbondioksit gazı pompalayıp sistemi sürekli ışık alan bir ortama bırakıyor. Araştırmacı, sistemde güneş enerjisi ve yeterli üretici-tüketici dengesi olduğu için fanusun dışarıdan madde almadan yıllarca yaşayacağını öne sürüyor. Ancak birkaç ay sonra canlılık faaliyetleri tamamen duruyor.

Araştırmacının 'Bu sistem sonsuza dek kendi kendine yeter' hipotezinin çökmesine neden olan temel ekolojik hata ve sistemin durma sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?

- A) Sisteme başlangıçta eklenen ekstra karbondioksit zamanla tüketici böcekleri zehirlemiş, böcekler ölünce bitkilere karbondioksit akışı tamamen kesilmiştir.
- B) Azot bağlayıcı bakteriler atmosferdeki serbest azotu toprağa çok hızlı bağladığı için topraktaki mineral dengesi bozulmuş ve bitki kökleri kurumuştur.
- C) Sistemde ayrıştırıcı canlılar bulunmadığı için atıklar parçalanamamış, organik maddeler bitkilerin kullanabileceği inorganik minerallere dönüşemediğinden toprağın verimi tükenmiştir.
- D) Üreticilerin ürettiği oksijen miktarı kapalı fanusta zamanla aşırı artmış, bu durum fotosentez reaksiyonlarının çift yönlü çalışmasını engelleyerek enerji akışını durdurmuştur.

30. (5 Puan)

Bir tatlı su ekosisteminde; mavi-yeşil alg, su piresi, kurbağa ve yılan arasında bir besin zinciri bulunmaktadır. Göle karışan kimyasal bir atık nedeniyle kurbağa popülasyonu aniden azalıyor. Bir süre sonra göl suyunda oksijen azalırken yeşilimsi renk artışı gözleniyor ve bazı zehirli maddelerin oranında belirgin artış görülüyor.

Yukarıda verilen bilgiye göre gölde biyolojik birikimin artış göstermesi ve sudaki oksijen seviyesinin düşmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

- A) Yılan sayısının azalması
- B) Kurbağa sayısının azalması
- C) Su piresi sayısının artması
- D) Mavi-yeşil alg sayısının azalması

31. (5 Puan)

Bir ekosistemde besin zinciri kurgusu, üretici-tüketici ve ayrıştırıcı ilişkilerine dayanır. Dışarıdan yapılan müdahaleler sadece doğrudan tüketilen canlıyı değil, piramidin tüm basamaklarını dolaylı etkiler.

Bir araştırmacı kurduğu yapay ekosistemde P, R, S ve T canlı türlerinin sayısal değişimini izlemektedir. T türü ortama eklendikten sonra ortamdaki ışık şiddeti sabit tutulmuş, toprak mineral seviyesinin ise sürekli düştüğü gözlemlenmiştir. Ancak P türünün sayısındaki azalmaya karşılık, R türünün sayısında bir süre artış, ardından R türü de P'yi takip ederek ani bir düşüş yaşamıştır. Araştırmacının raporunda P türünün inorganik maddelerden klorofil sayesinde organik besin ürettiği belirtilmiştir. Buna göre;

- I. P türündeki azalma, doğrudan S türünün aşırı artışıyla açıklanabilir ve S otçuludur.
- II. T canlısının ortama dahil edilmesi, R canlısı için avcılık baskısını başlangıçta azaltmış, sonrasında besin yetersizliğine neden olmuş olabilir.
- III. Topraktaki mineral miktarının azalması, ortamda ayrıştırıcı mikroorganizmaların işlevini yerine getiremediğini veya yeterli sayıya ulaşmadığını gösterir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) II ve III
- C) I ve III
- D) I, II ve III

32. (5 Puan)

Bir araştırmacı, izole bir göl ekosisteminde su bitkisi (X) → otçul böcek (Y) → etçil kurbağa (Z) → su yılanı (T) şeklinde bir besin zinciri gözlemliyor. Ekosisteme, sadece T canlısı ile aynı nişi paylaşan ancak T'ye göre çok daha hızlı üreyen ve toksin biriktirme hızı daha yavaş olan yeni bir tür yılan (V) tesadüfen dahil oluyor. Aynı zamanda göle, Y canlısının popülasyonunu etkilemeyen, ancak Z canlısının %40 oranında azalmasına neden olan bir virüs yayılıyor. Araştırmacının bir yıl sonraki notlarında; 'T canlısının dokularındaki biyolojik birikim eskiye oranla değişmezken, T'nin toplam popülasyon enerjisi belirgin bir şekilde azaldı ve gölde X bitkisinde aşırı artış (alg patlaması benzeri) yaşandı' yazıyor. Bu duruma göre, göldeki ekolojik değişim süreciyle ilgili hangi çıkarım kesinlikle yanlıştır?

- A) Z kurbağalarının virüs nedeniyle azalması, Y böceklerinin üzerindeki avcı baskısını kaldırdığı için Y sayısında artış yaşanmış, bu durum X bitkisinin hızla azalmasına yol açmalıdır.
- B) V yılanının rekabette T yılanını geride bırakması, T yılanının popülasyonunda ve dolayısıyla bu popülasyonun tuttuğu toplam enerjide düşüşe neden olmuştur.
- C) Araştırmacının notlarında bahsettiği 'X bitkisinde aşırı artış' durumu, Y canlısının virüsten etkilenmeyip V türü tarafından kontrol altında tutulduğu hatalı bir varsayıma dayanıyor olabilir.
- D) Yeni gelen V yılanı daha az toksin biriktirmesine rağmen besin piramidinin en üstünde yer aldığından, X'den başlayan zehir birikimi Z'den hem T'ye hem V'ye aktarılmaya devam etmiştir.

33. (5 Puan)

Bir araştırmacı, dış ortamdan tamamen yalıtılmış cam bir fanus içinde bir ekosistem kuruyor. Fanusa steril (içinde hiçbir canlı bulunmayan) toprak, üretici bitkiler, otçul çekirgeler ve bir miktar su ekliyor. Düzenli olarak fanusa güneş ışığı veriliyor ve ortam sıcaklığı 25°C'de sabit tutuluyor. Üç aylık gözlem sonucunda araştırmacı şu verileri kaydediyor:

1. İlk ay çekirge popülasyonu dengede kalmış, bitkiler büyümüştür.
2. İkinci ay toprak yüzeyinde ölü çekirge ve dökülen bitki yaprakları kalın bir tabaka halinde birikmeye başlamıştır.
3. Üçüncü ayın sonunda topraktaki azotlu mineral miktarı tükenmiş, bitkilerin fotosentez hızı durma noktasına gelmiş ve ekosistem tamamen çökmüştür.

Bir öğrenci deney raporuna şu sonucu yazmıştır: 'Fanus yalıtılmış olduğu için içeriye ayrıştırıcı canlılar girememiştir. Ayrıştırıcılar olmadığı için bitkiler hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları besini (enerjiyi) topraktaki ölü organizmalardan alamamış ve açlıktan ölmüşlerdir.'

Deney sonuçları ve öğrencinin notları incelendiğinde, öğrencinin yaptığı bilimsel hata ve ekosistemin çöküşüne yol açan asıl mekanizma aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Öğrenci üreticilerin aynı zamanda tüketici olabileceğini göz ardı etmiştir; asıl sorun, mantarların yokluğunda bitkilerin doğrudan ölü atıklardaki organik yapıları emmek zorunda kalıp zehirlenmesidir.
- B) Öğrenci ayrıştırıcıların yalnızca hayvansal atıkları parçaladığını düşünmüştür; asıl sorun, ölü yaprakların toprağın üzerini tamamen kapatarak bitkilerin güneş ışığı almasını engellemesidir.
- C) Öğrenci fotosentez için karbondioksit gerektiği gerçeğini atlamıştır; asıl sorun, ayrıştırıcıların solunum yapamaması sonucu ortamdaki oksijenin hızla tükenmesi ve bitkilerin kurumasıdır.
- D) Öğrenci bitkilerin enerjiyi topraktan (ayrıştırıcılardan) değil güneşten aldığını kavramamıştır; asıl sorun, ayrıştırıcılar olmadığı için ölü atıkların inorganik maddelere dönüşmemesi ve bitkinin temel mineral ihtiyacının karşılanamamasıdır.

34. (5 Puan)

Kapalı bir ekosistem modelinde biyolojik döngülerin incelenmesi

Bir öğrenci ekosistemdeki madde döngüleri üzerine bir proje hazırlarken kapalı bir ekosistem modeli oluşturmuştur. Bu modele sadece bitkiler, otçul hayvanlar ve ayrıştırıcılar eklemiştir. Sistem bir süre sonra çökmüştür. Öğrenci, hatasını analiz ederken şu hipotezleri ileri sürmüştür:

- I. Sistemde azot bağlayıcı bakteriler olmadığı için havadaki azot doğrudan toprağa bağlanamamış ve bitki gelişimi durmuştur.
- II. Ayrıştırıcılar, bitki ve hayvan atıklarındaki organik maddeleri parçalayarak fotosentez için gereken karbondioksiti atmosfere vermemiştir, bu yüzden karbon döngüsü durmuştur.
- III. Ayrıştırıcılar amonyağı oluşturmuş ancak bunu bitkilerin kullanabileceği nitrat gibi inorganik formlara dönüştüren kemosenetik bakteriler (nitrifikasyon) eklenmemiştir.
- IV. Ayrıştırıcılar organik atıkları biriktirerek ekosistemin biyokütlesini suni bir şekilde aşırı artırmıştır.

Sistemin çökmesinin temel nedeni olarak öğrencinin kurduğu hipotezlerden hangileri madde döngülerindeki işleyişe bilimsel olarak uygundur?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) III ve IV
- D) II ve IV

35. (5 Puan)

Bir ekolog, kimyasal atık sızıntısı yaşanan kapalı bir göl ekosistemindeki K, L, M ve N türlerinden oluşan bir besin zincirini araştırmaktadır. Bir öğrenci laboratuvarındaki ilk ölçümlere bakarak besin piramidini aşağıdan yukarıya doğru $L \rightarrow K \rightarrow N \rightarrow M$ şeklinde modelliyor. Ekolog ise bu çizimi inceleyerek modelin hatalı olduğunu; hem ekosistemde en fazla toplam enerjiye sahip canlının tabana yerleştirilmediğini hem de dokularında en fazla zehir biriken canlının tavan basamağında olmadığını belirtiyor.

Saha çalışmalarından elde edilen güncel ve kesin veriler ise şunlardır:

- L türünün dokularında biriken kimyasal madde konsantrasyonu, K türündekinden fazla, N türündekinden ise daha azdır.
- M türünün oluşturduğu toplam biyokütle miktarı, ekosistemdeki diğer tüm canlıların toplamından daha fazladır.
- N türünün vücut büyüklüğü en fazla, yıllık ortalama yavru sayısı ise en düşüktür.
- K türü, metabolik faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi doğrudan ve yalnızca M türünü tüketerek karşılamaktadır.

Buna göre, bu göl ekosistemine ait doğru besin piramidindeki canlı dizilimi (üreticiden son tüketiciye doğru) aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

- A) M - K - L - N
- B) N - L - K - M
- C) M - N - L - K
- D) M - L - K - N

36. (5 Puan)

Kapalı, ışık alan ve sıcaklık kontrollü bir cam fanus içinde bitkiler, otçul böcekler ve toprak mikroorganizmaları kullanılarak dengeli bir ekosistem modeli kurulmuştur. Fanustaki gaz oranları, nem ve topraktaki mineral miktarları sensörlerle günlük olarak takip edilmektedir. Başlangıçta dengede olan bu sisteme, sadece tek bir biyolojik gruba hedef alan kimyasal bir 'X maddesi' enjekte ediliyor.

Enjeksiyondan 15 gün sonra şu değişimler kaydediliyor:

1. Toprak yüzeyinde dökülen yaprak ve ölü böcek kalıntılarının kütlesi üç katına çıkmıştır.
2. Havadaki nem oranı değişmezken, karbondioksit (CO₂) oranı hızla düşmüş ve minimum seviyeye inmiştir.
3. Topraktaki azotlu bileşiklerin (nitrat) miktarı sıfıra yaklaşmıştır.

Bu verileri inceleyen bir araştırmacı, "X maddesi ortamdaki otçul böcekleri öldürmüştür. Böcekler solunum yapmadığı için CO₂ azalmış ve dışkılamadıkları için topraktaki azot tükenmiştir." çıkarımını yapıyor.

Buna göre, araştırmacının çıkarımı ve sistemdeki asıl sorun ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi en kesin ve doğrudur?

- A) Araştırmacının çıkarımı yanlıştır; X maddesi havadaki serbest azotu toprağa bağlayan bakterileri yok etmiştir. Azot eksikliği bitki fotosentezini durdurduğu için ortamdaki CO₂ birikimi engellenmiştir.
- B) Araştırmacının çıkarımı doğrudur; otçul tüketiciler ekosistemdeki tek CO₂ ve organik azot kaynağı olduğu için, yokluklarında karbon ve azot döngüsü tamamen çöker.
- C) Araştırmacının çıkarımı eksiktir; X maddesi üreticileri (bitkileri) etkilemiştir. Bitkiler ölüp organik atık miktarını artırmış, fotosentez durduğu için havadaki CO₂ üretimi sonlanmıştır.
- D) Araştırmacının çıkarımı yanlıştır; X maddesi ayrıştırıcıları yok etmiştir. Bu yüzden organik atıklar parçalanamamış, toprağa azotlu bileşik aktarımı durmuş ve ayrıştırıcıların solunumu kesildiği için havadaki CO₂ azalmıştır.

37. (5 Puan)

Ekoloji piramidi, üreticiden tüketiciye doğru biyolojik birikim, aktarılan enerji, biyokütle ve birey sayısı gibi özelliklerin nasıl değiştiğini açıklar.

Bir araştırmacı, kimyasal bir sızıntının yaşandığı kapalı bir tatlı su ekosisteminde dört farklı türün (K, L, M, N) dokularındaki ağır metal birikimini ölçüyor ve şu sonuçları elde ediyor:

- K türü: 0.05 ppm
- L türü: 1.20 ppm
- M türü: 0.30 ppm
- N türü: 5.40 ppm

Ayrıca ortamdaki güneş ışığı miktarının %20 oranında azalmasının K türünün biyokütlesinde keskin bir düşüşe neden olduğu biliniyor. M türünün sayısındaki aşırı artışın L türünü olumsuz etkilediği, ancak N türünün popülasyonunu hızla artırdığı gözlemleniyor. Bir öğrenci, bu verilerle ekosistemin besin piramidini oluşturup şu çıkarımları yapıyor:

- I. M türündeki bireylerin toplam kütlesi (biyokütle), L türündeki bireylerin toplam kütlesinden fazladır.
- II. N türüne aktarılan toplam enerji miktarı, en düşük seviyededir.
- III. L türünün vücut büyüklüğü kesinlikle M türünden büyüktür.

Buna göre öğrencinin yaptığı bu çıkarımlardan hangileri ekoloji piramidinin genel kuralları ve verilen veriler bağlamında kesinlikle yanlıştır?

- A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) Yalnız III

38. (5 Puan)

Kapalı bir tatlı su biyomuna sızan kimyasal bir zehrin X, Y, Z, Q ve W canlı popülasyonlarındaki etkileri ve aralarındaki madde aktarımı bir yıl boyunca incelenerek şu rapor tutulmuştur: Ortama verilen radyoaktif işaretli karbon atomlarına ilk olarak fotosentetik klorofillere sahip X canlısının yapısında rastlanmıştır. Kimyasal zehir analizlerinde dokulardaki zehir birikimi miktarının Q canlısında Z'den az, Y'den ise fazla olduğu saptanmıştır. Popülasyon dinamikleri incelendiğinde, Z canlısı miktarındaki ani artışın göldeki Q miktarını hızla azalttığı, buna karşılık Y popülasyonunda beklenmedik bir artışa neden olduğu gözlemlenmiştir. Ortam şartlarındaki asitlik değişimi W canlısını yok ettiğinde ise tüm basamaklardaki organik atıklar birikmiş ve ekosistem çökmüştür. Ek bir not olarak, Q canlısının ortalama vücut büyüklüğünün Y canlısından oldukça küçük olduğu rapora eklenmiştir. Bu raporu okuyan bir öğrenci, canlıların yer aldığı ekoloji piramidini tabandan tavana doğru 'W → X → Y → Q → Z' şeklinde modellemiştir.

Buna göre, öğrencinin oluşturduğu ekoloji piramidi ile ilgili yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi bilimsel olarak doğrudur?

- A) Doğrudur; vücut büyüklüğü genellikle yukarı doğru arttığı için Q'nun Y'den küçük olması sistemin dengede olduğunu ve sıralamanın kayıpsız ilerlediğini kanıtlar.
- B) Yanlıştır; Z canlısı arttığında Y de artış gösterdiği için Y'nin Z'yi avlayarak beslendiği çıkarılmalıdır, bu nedenle dizilim X - Q - Z - Y şeklinde değiştirilmelidir.
- C) Yanlıştır; Q canlısının vücut büyüklüğü Y'den küçük olduğuna göre enerji piramidinde Q alt basamakta yer almalı ve doğru sıralama X - Q - Y - Z olarak güncellenmelidir.
- D) Yanlıştır; W canlısı madde döngüsünü sağlayan ayrıştırıcı olduğundan her basamakla bağlantılı olmalıdır, en alt basamakta ototrof olan X bulunmalı ve sıralama X - Y - Q - Z şeklinde olmalıdır.

39. (5 Puan)

Ahmet, azot döngüsünü modellemek için tamamen kapalı bir cam fanus sistemi tasarlıyor. İçine steril (içinde hiçbir mikroskobik canlı olmayan) toprak, bir miktar su, canlı bir fasulye bitkisi ve bitkinin köklerine laboratuvar ortamında çoğaltılmış sadece azot bağlayıcı bakteriler ekliyor. Fanusa atmosferik oranlara uygun şekilde %78 Azot (N_2), %21 Oksijen (O_2) ve bir miktar Karbondioksit (CO_2) gazı doldurarak sistemi hava almayacak şekilde kapatıyor. Düzenek güneş ışığı alan bir yere bırakılıyor. İlk iki ay bitkinin hızla büyüdüğü, yeni yapraklar açtığı gözlemleniyor (bitkinin fotosentez ve solunum hızının eşit olduğu varsayılıyor). Ancak üçüncü ayın sonunda bitkinin yaprakları sararmaya, büyümesi durmaya başlıyor ve toprak analizi yapıldığında topraktaki nitrat tuzlarının tamamen tükendiği tespit ediliyor. Ahmet'in arkadaşları bu durumu tartışıyorlar.

Ahmet'in projesindeki sonuçlar ve öğrencilerin değerlendirmeleri dikkate alındığında, azot döngüsündeki bu başarısızlığın temel nedeni ve hangi öğrencinin yaptığı yorum bilimsel olarak doğrudur?

- A) Mert: 'Sistemde yıldırım gibi enerji kaynakları olmadığı için azot toprağa bağlanamadı.'
- B) Can: 'Sistemde organik atıkları inorganik forma dönüştürecek ayrıştırıcı ve azot ayrıştırıcı bakterilerin eksikliği nedeniyle topraktaki kullanılabilir azot tükendi.'
- C) Elif: 'Cam fanustaki oksijen miktarı azaldığı için bitki topraktaki azotu organik maddeye dönüştüremedi.'
- D) Ayşe: 'Kullanılan fasulye bitkisi fotosentez hızını düşürdüğü için havadaki azotu bağlayamadı.'

40. (5 Puan)

Bir bilim dergisinde yayınlanan kapalı bir ekosistem araştırmasında, ortamdaki azot ve karbon döngüsünün durduğu ve bitkilerin (D canlısı) gelişiminin yavaşladığı, bunu takiben otçul böceklerin (C canlısı) ve etçil örümceklerin (B canlısı) sayılarının hızla azaldığı görülmüştür. Ortama her gün belirli miktarda su ve güneş ışığı verilmesine rağmen ekosistem çökmeye başlamıştır. Sekizinci sınıf öğrencisi Ahmet, bu ekosistemin enerji piramidini çizerek sorunu modellemek ister. Ahmet modelinde tabana D canlısını, üstüne C canlısını, onun da üstüne B canlısını koyar. Piramidin en tepesine (4. basamağa) ise ayrıştırıcı (A canlısı) bakterileri ekleyerek, ortamdaki A canlısı sayısının yetersizliği nedeniyle piramidin en üst seviyesine aktarılması gereken %10'luk enerjinin iletilemediğini, bu yüzden madde döngüsünün tıkanıldığını öne süren bir hipotez kurar.

Ahmet'in hipotezi ve modellemesindeki hata hangi seçenekte doğru olarak açıklanmıştır?

- A) Hata, güneşten gelen toplam enerjinin sadece %10'unun D canlısına ulaşacağına varsayılmasıdır; güneş enerjisinin tamamı D canlısı tarafından kullanılır.
- B) Hata, ayrıştırıcıların enerji piramidinin en üst basamağına yerleştirilmesidir; ayrıştırıcılar her basamakta bulunmalıdır ve enerjinin %10'u onlara değil bir üst basamağa geçer.
- C) Hata, üreticilere aktarılan mineral miktarının hesaplanmasıdır; mineraller enerjinin tersine azalmadan tam olarak üreticilere geçer.
- D) Hata, C canlısından B canlısına enerji akışının yönünün yanlış çizilmesidir; otçulardan etçillere doğru değil, etçillerden otçullara doğru enerji akar.

41. (5 Puan)

Bir göl ekosistemindeki X, Y, Z ve T canlılarının dokularında biriken çözünmez bir ağır metalin (kurşun) miktarları ve toplam biyokütleleri ölçülmüş, göl suyunun yıllık pH değişimleri not edilmiştir (göl pH'ı yıl boyunca 6.8 ile 7.2 arasında dalgalanmıştır). Araştırmacı şu verileri kaydetmiştir: 1. Y türünün dokularındaki kurşun miktarı 0.02 ppm, toplam biyokütlesi 50.000 kJ/m²'dir. 2. X türünün dokularındaki kurşun miktarı 18.5 ppm, toplam biyokütlesi 50 kJ/m²'dir. 3. Z türünün dokularındaki kurşun miktarı 2.1 ppm, toplam biyokütlesi 5.000 kJ/m²'dir. 4. T türünün biyokütlesi sabite yakın olup, hücre dışı enzimleriyle tüm bu canlıların kalıntılarını inorganik minerallere dönüştürmektedir. Beklenmedik bir şekilde, göle sonradan bulaşan ve sadece Z türüne etki eden spesifik bir mantar hastalığı hızla yayılmaya başlamıştır.

Araştırmacının defterindeki verilere ve ekosistem dinamiklerine göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi biyolojik açıdan doğrudur?

- A) Z türü ortamdan tamamen silinirse, X türü doğrudan Y türü ile beslenmeye başlayarak enerji akışını devam ettirir.
- B) Ortama karışan hastalık Z türünü hızla yok ederse, kısa vadede Y'nin biyokütlesi artarken T'nin parçalayacağı organik atık miktarı anlık bir tepe noktası yapar.
- C) Biyokütlesi en düşük olan X canlısı, güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirmede en yüksek verime sahip olan ototrof (üretici) organizmadır.
- D) T canlısı fotosentez hızının azalmasından doğrudan etkilenmez çünkü sadece Y türünün oluşturduğu organik atıklarla beslenir.

42. (5 Puan)

Ekosistemlerde enerji akışı tek yönlüdür, güneşten başlar ve üreticilerden tüketicilere doğru her basamakta yaklaşık %10 oranında aktararak (%90'ı ısı ve metabolik faaliyetlerle kaybedilerek) ilerler. Madde döngüsü ise ayrıştırıcılar sayesinde (inorganik maddelerin üreticilere dönmesiyle) kapalı bir sistemde sürekli devam edebilir.

Bir araştırmacı, laboratuvarında kapalı bir biyosfer tasarlayarak kendi kendine yetebilen bir ekosistem kurmak istiyor. Fanusa sabit sıcaklık (25°C) ve günde 12 saat ışık sağlıyor. Sisteme başlangıçta 10.000 kJ net enerji üretebilen bitkiler (üretici), sadece bu bitkilerle beslenen tırtıllar (1. tüketici), tırtıllarla beslenen kertenkeleler (2. tüketici) ve yeterli miktarda ayrıştırıcı mantar ekliyor. Kurulan bu sistemde, bir kertenkelenin hayatta kalabilmesi için ekosistemden alması gereken asgari enerjinin 250 kJ olduğu biliniyor.

Birkaç hafta sonra kertenkelelerin tamamının öldüğü, tırtıl ve bitki popülasyonlarının ise belirli bir dengede yaşamaya devam ettiği, ayrıştırıcıların da çoğaldığı gözlemleniyor.

Araştırmacının asistanı, kertenkelelerin ölümüyle ilgili sistemin çöküş nedenlerini araştırmak için aşağıdaki tespitleri raporluyor:

- I. Bitkilerin sağladığı başlangıç enerjisinin besin zinciri kuralı gereği kertenkelelerin bulunduğu trofik düzeye aktarılabilen miktarının 100 kJ'de kalması, kertenkelelerin asgari enerji ihtiyacını (250 kJ) karşılamamıştır.
- II. Ayrıştırıcı mantarların, ölen tırtıllardaki organik atıkları parçalayarak açığa çıkardığı enerjiyi sistemdeki bitkilere geri aktarma hızının yavaş olması kertenkelelerin aç kalmasına neden olmuştur.
- III. Ortam sıcaklığının (25°C) sabit tutulması tırtılların yaşamsal faaliyetlerini hızlandırmış ve sistemdeki biyokütle enerjisinin büyük kısmını ısı olarak kaybetmelerine yol açtığından kertenkeleye ulaşması gereken 1.000 kJ'lük potansiyel enerji azalmıştır.

Buna göre, asistanın raporundaki tespitlerden hangileri ekolojideki enerji ve madde akışı kurallarına uygun, bilimsel olarak doğru bir açıklamadır?

A) I ve III

- B) II ve III
C) Yalnız I
D) I, II ve III

43. (5 Puan)

Bir orman ekosisteminde güneşlenme süresi, sıcaklık ve yağış değerleri uzun yıllar ortalamasında seyretmektedir. Ancak ekosisteme dışarıdan giren ve sadece tek bir otçul böcek türünü (1. dereceden tüketici) enfekte eden spesifik bir virüs, bu böceklerin sayısında ani ve kütleli bir azalmaya neden olmuştur. Araştırmacılar takip eden 6 ay boyunca şu verileri kaydetmiştir: 1- Sadece bu böceklerle beslenen küçük kuş türlerinin sayısında belirli bir süre sonra belirgin bir azalma. 2- Tüketilen bitki türünün toplam biyokütlesinde belirgin bir artış. 3- Topraktaki ayrıştırıcı organizmaların sayısında ilk haftalarda ani bir artış, takip eden aylarda ise salgın öncesine kıyasla genel bir düşüş.

Bir öğrencinin bu verilerle ilgili yaptığı aşağıdaki çıkarımlardan hangileri ekolojik kurallara uygun ve doğru bir değerlendirmedir? (I. Böcekçil kuşların popülasyonundaki yavaşlamanın nedeni, virüsün besin zinciri boyunca aktarılaraq üst basamaklarda biyolojik birikime uğraması ve zehir etkisinin artmasıdır. II. Üretici biyokütlesindeki artış, bitkiler üzerindeki tüketici baskısının kalkmasıyla ilgilidir; ancak ayrıştırıcıların sonradan genel bir düşüşe geçmesi, uzun vadede bitkilerin ihtiyaç duyduğu inorganik maddelerin topraktaki döngüsünü yavaşlatabilir. III. Ayrıştırıcıların salgın başlangıcında gösterdiği ani popülasyon sıçraması, kütleli ölümler sonucu oluşan yoğun organik atıkların ayrıştırıcılara bir anda yüksek miktarda besin sağlamasıyla açıklanır.)

- A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız II

44. (5 Puan)

Bir biyoloji araştırmacısı, dışarıdan tamamen izole edilmiş şeffaf bir fanus içinde yalnızca fasulye bitkileri (üreticiler) ve bu bitkilerle beslenen yaprak bitlerinden (birincil tüketiciler) oluşan kapalı bir ekosistem tasarlamıştır. Sistem dışarıdan sadece güneş enerjisi almaktadır ve içerideki su miktarı ile 25 derece sıcaklık sabit tutulmuştur. İlk üç ay boyunca popülasyonlar dengeli görünse de dördüncü aydan itibaren zemin üzerinde dökülen kuru yaprakların ve böcek dışkılarının aşırı miktarda biriktiği, bitkilerin ise ortamda yeterli ışık ve su olmasına rağmen büyümeyi durdurarak sararmaya başladığı gözlemlenmiştir.

Araştırmacı, bitkilerin büyümesini tekrar hızlandırmak için ekosisteme böceklerle beslenen avcı türler (ikincil tüketiciler) eklemeye karar vermiştir. Araştırmacının bu çözüm önerisi ve sistemdeki temel ekolojik sorun ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi bilimsel olarak doğrudur?

- A) Bu çözüm hatalıdır; avcı türlerin eklenmesi ekosistemdeki enerji akışını tersine çevireceği için besin zincirinin en altındaki üreticiler tamamen yok olacaktır.
- B) Bu çözüm hatalıdır; sistemde organik atıkları inorganik maddelere çevirecek ayrıştırıcıların eksikliği toprağın mineral bakımından fakirleşmesine neden olmuştur.
- C) Bu çözüm doğrudur; besin piramidine yeni bir basamak eklenmesi, biriken kuru yaprak ve atıkların daha hızlı çürütmesini sağlayarak madde döngüsünü başlatır.
- D) Bu çözüm doğrudur; sisteme eklenen ikincil tüketiciler böcek sayısını azaltacak ve böylece üreticilerin fotosentez için ihtiyaç duyduğu su miktarı artacaktır.

45. (5 Puan)

Bir ekolog, yapay bir kapalı ekosistem (biyosfer) tasarlarlarken bir enerji piramidi kuruyor. İlk tasarımında şu türleri kullanıyor: Üretici olarak A bitkisi, birincil tüketici olarak B böceği, ikincil tüketici olarak C kuşu ve tüm basamaklardaki organik atıkları inorganik maddelere çeviren D bakteri türü. Ekolog, sisteme günlük 10.000 Joule ışık enerjisi veriyor ve A bitkisinin bu enerjinin %100'ünü kimyasal enerjiye çevirdiğini (fotosentez veriminin %100 olduğunu) varsayarak, C kuşunun bu sistemden günlük 100 Joule enerji alacağını hesaplıyor. Ayrıca, B böceğinin ortamdaki zehirli bir maddeyi hızla vücudunda biriktirdiğini ve C kuşunda zehir birikiminin B böceğinden daha az olacağını öngörüyor. Son olarak, ortama D türünden bir virüsün girip D bakterilerini tamamen yok etmesinin sadece atık miktarını artıracaklarını, A bitkisinin gelişimini etkilemeyeceğini düşünüyor. Buna göre ekoloğun tasarımı ve varsayımlarındaki hatalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ekolog, enerji aktarım hesaplamasında yanılmamıştır; %10 kuralına göre 10.000 Joule alan sistemde C kuşuna 100 Joule ulaşır.
- B) Ekolog, ayrıştırıcıların (D bakterisi) yok olmasının etkisini eksik değerlendirmiştir; inorganik madde döngüsü duracağı için A bitkisi besin üretemez hale gelir.
- C) Ekolog, A bitkisinin ışık enerjisini kimyasal enerjiye çevirme verimini hatalı varsaymıştır; üreticiler ışık enerjisinin sadece küçük bir kısmını bağlayabilir.
- D) Ekolog, biyolojik birikim (zehir birikimi) kuralını ters yorumlamıştır; piramitte yukarı çıkıldıkça dokularda biriken zehir miktarı artar.

46. (5 Puan)

Kapalı sistemlerde madde döngülerinin sürdürülebilirliği

Bir grup araştırmacı, dışarıdan sadece ışık alan kapalı bir cam fanus içinde yapay bir ekosistem kurmuştur. Fanusa nemli toprak, yeşil bitkiler, otçul böcekler ve su eklenmiştir. İlk birkaç hafta fanus yüzeyinde düzenli terleme ve yoğunlaşma gözlenmiş, böceklerin bitkilerle beslendiği görülmüştür. Ancak 3. ayın sonunda böcekler ölmüş ve bitkilerin gelişimi durarak yaprakları sararmıştır. Yapılan ölçümlerde şu veriler elde edilmiştir:

- Topraktaki çürümüş yaprak ve organik dışkı miktarı sürekli artmıştır.
- Topraktaki bitkilerin kullanabileceği azot tuzları tükenmiştir.
- Fanus içindeki havanın oksijen oranı başlangıça göre yüksek, karbondioksit oranı ise kritik seviyede düşüktür.

Araştırmacılardan biri bu durumu şu şekilde yorumlamıştır: 'Sistemin çökmesinin temel nedeni, böceklerin ölmesiyle havaya verilen karbondioksitin azalması ve bitkilerin fotosentez yapamamasıdır.'

Bu araştırmacının yorumu ve fanustaki veriler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Fanusta yalnızca azot bağlayan bakteriler eksiktir; karbondioksit miktarının düşmesi organik atıkların aşırı artmasından kaynaklandığı için araştırmacı karbon döngüsünü yanlış analiz etmiştir.
- B) Su döngüsü çok hızlı gerçekleşip terleme-yoğuşma dengesi bitkileri strese soktuğu için ekosistem çökmüştür; dolayısıyla karbon veya azot eksikliği temel sebep değildir.
- C) Araştırmacının yorumu tamamen doğrudur; böcekler karbon döngüsünün tek üreticisi olduğu için yokluklarında bitkilerin azotu kullanması imkânsız hâle gelmiştir.
- D) Araştırmacının yorumu eksiktir; asıl sorun topraktaki ayrıştırıcı organizmaların yetersizliği nedeniyle organik atıkların parçalanamaması, bu sebeple de karbon ve azot döngülerinin aynı anda kilitlenmesidir.

47. (5 Puan)

Bir araştırmacı, endüstriyel atıklarla kirlenmiş kapalı bir tatlı su ekosisteminde yaşayan ve aralarında tek yönlü bir besin zinciri bulunan K, L, M ve N canlı türlerinden örnekler almıştır. Analizlerde dokulardaki ortalama ağır metal birikimi oranları K için 10 ppm, L için 0.2 ppm, M için 140 ppm ve N için 2 ppm ölçülmüştür. Suyun ortalama pH değeri 6.5 olup sıcaklık yıl boyu 15 santigrat derecedir. Bir öğrenci olan Mert, bu verileri inceleyerek besin zincirini 'M → K → N → L' şeklinde modellemiş ve 'Sistemdeki toplam biyokütlesi en fazla olan ve güneş enerjisini ilk kullanan canlı M türüdür' çıkarımını yapmıştır.

Buna göre Mert'in ekoloji piramitleri ile ilgili kurduğu modellemedeki temel hata aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?

- A) Biyolojik birikimin besin piramidinde yukarıya doğru çıkıldıkça azaldığını düşünerek üretici ve son tüketici konumlarını tamamen ters yerleştirmesi.
- B) Canlıların vücut büyüklüğü ile dokularındaki zehir miktarının her zaman doğru orantılı olarak artacağını varsayması.
- C) Gölün fiziksel şartlarının (pH ve sıcaklık) besin zincirindeki toplam enerji aktarım verimini değiştirebileceğini düşünmesi.
- D) Aktarılan enerji miktarının en az olduğu canlı grubunun piramidin tabanında yer alması gerektiğini göz ardı etmesi.

48. (5 Puan)

Ekosistemlerde enerji akisi, ureticilerin gunesten aldigi enerjiyi organik maddelere donusturmesiyle baslar. Besin zincirindeki her aktarimda enerjinin buyuk bir kismi metabolik faaliyetler ve isi kaybi nedeniyle sistemden ayrilir. Bu durum, piramidin en ustundeki canliya ulasan enerjinin neden cok az oldugunu aciklar.

Bir arastirmaci, izole bir ekosistemdeki K, L, M ve N canlilarinin ozelliklerini inceleyerek su notlari almistir: N canlisi hucresel solunum icin gerekli olan enerjiyi K, L ve M canlilarinin atiklarini parcalayarak saglar. K canlisi cevresindeki inorganik maddeleri kullanarak organik madde sentezlerken ortamdaki karbondioksit miktarini azaltir. L canlisi sadece K ile, M canlisi ise sadece L ile beslenir. Arastirmaci canlilarin ortalama yasam surelerini de K: 3 ay, L: 1 yil, M: 5 yil, N: 15 gun olarak kaydetmistir. Bir ogrenci bu ekosistemdeki enerji akisini modelleyerek su hipotezi kurmustur: 'M canlisinin dokularinda 10 Joule degerinde enerji depolayabilmesi icin K canlisinin 1000 Joule gucunde enerjiyi kimyasal bag enerjisine cevirmesi zorunludur. Ayrica, besin piramidinde asagidan yukariya dogru cikildikca enerji depolanarak biriktiginden, N canlisi en cok enerjiyi en ust basamaktaki M canlisinin kalintilarini parcaladiginda elde edecektir.' Bu ogrencinin kurdugu hipotezdeki hatalarin tespit edildiği en dogru aciklama asagidakilerden hangisidir?

- A) Ekosistemdeki canlilarin yasam sureleri yukari cikildikca arttigi icin piramidin yonu ters doner, bu yuzden sistemdeki asil enerji kaybi N canlisinin parcalama islemini cok kısa surede yapmasidir.
- B) Enerjinin piramitte yukari cikildikca azalmasi ve biyokutlenin kuculmesi dogrudur, fakat M canlisi enerjiyi N canlisina sadece isisal formda aktarabildigi icin dogrudan bir enerji birikiminden soz edilemez.
- C) Besin piramidinde yukari cikildikca enerji birikmez, her basamakta isi ve metabolik faaliyetler nedeniyle azalarak aktarilir; bu nedenle N canlisina en fazla enerjiyi ureten basamak K canlisinin kalintilaridir.
- D) N canlisinin sistemdeki tum basamaklarin kalintilarini parcaladigi cikarimi hatalidir; ayrica K canlisinin 1000 Joule degil, 100 Joule enerji uretmesi M canlisi icin yeterli olacaktir.

49. (5 Puan)

Bilim insanlari, kirlenmis ekosistemlerde canli turlerinin enerji ve madde aktarimlarini analiz ederken, çevresel toksinlerin besin zincirindeki ilerleyisini incelemektedir. Bu analizler, hangi türün ekolojik piramidin hangi basamağında yer aldığını saptamak için önemlidir.

Bir ekoloji araştırmacısı, endüstriyel atıklarla kirlenmiş kapalı bir göl ekosisteminde yaşayan K, L, M ve N türlerinin popülasyonlarını incelemiştir. Yapılan ölçümlerde bu türlerin toplam biyokütleleri, dokularındaki ağır metal (zehir) birikim oranları ve ortalama yaşam süreleri tabloya kaydedilmiştir:

Tür	Toplam Biyokütle (kg)	Biyolojik Birikim (ppm)	Ortalama Yaşam Süresi (Ay)
K	15	180,0	48
L	15.000	0,05	6
M	1.500	0,8	12
N	150	14,0	24

Bir öğrenci, tablodaki verilere dayanarak şu çıkarımı yapmıştır: 'Ağır metaller suya doğrudan karıştığı için zehiri ilk ve en yoğun şekilde alan canlılar üreticilerdir. Buna göre ekosistemdeki enerji akış yönü $K \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow L$ şeklinde olmalıdır.'

Bu öğrencinin oluşturduğu besin zinciri modeli ve gerekçesi ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi bilimsel olarak kesinlikle doğrudur?

- A) Öğrencinin oluşturduğu zincir doğrudur; ekosistemlerde enerjinin ilk girdiği üretici basamağı, zehirli maddelere doğrudan maruz kaldığından biyolojik birikimi en yüksek olan gruptur.
- B) Öğrenci modeli yanlış kursa da biyokütle kuralını doğru kullanmıştır; çünkü enerji akışı her zaman biyokütlesi en az olandan en fazla olana doğru aktarılır.
- C) Öğrenci biyolojik birikim mekanizmasını ters yorumlamıştır; zehirli madde miktarı üst basamaklara doğru arttığı ve enerjinin çoğu ısı olarak kaybedildiği için zincir $L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow K$ olmalıdır.
- D) Öğrencinin enerji akış yönü varsayımı hatalıdır; ortalama yaşam süresi en kısa olan canlı (L) enerji piramidinin en üstünde yer almalıdır.

50. (5 Puan)

Bilim insanları, tarımsal ilaçların karıştığı bir göl ekosisteminde kirliliğin canlılar üzerindeki etkisini modellemek için çeşitli türlerden örnekler toplamıştır. Enerji akışı ve biyolojik birikim prensipleri, ekosistemin hangi basamaklarının risk altında olduğunu saptamada temel alınır.

Bir göl ekosistemindeki P, R, S ve T türlerinin besin zincirindeki yerlerini belirlemek için aşağıdaki tablo oluşturulmuştur:

Canlı Türü	Bir Üst Basamağa Aktarılan Enerji (J)	Dokularda Biriken Toksik Madde (ppm)	Ortalama Vücut Ağırlığı (kg)
P	Bilinmiyor	45.00	5.2
R	10.000	Bilinmiyor	0.8
S	100.000	0.02	0.1
T	Bilinmiyor	4.50	1.5

Bir araştırmacı, bu verileri inceleyerek şu yorumu yapmıştır: *'P canlısının dokularındaki zehir miktarı en yüksek olduğu için besin piramidinin en üstündedir. Aynı zamanda P'nin ortalama vücut ağırlığı S'den fazladır; bu da P türünün toplam biyokütlesinin S türünün toplam biyokütlesinden kesinlikle daha büyük olduğunu kanıtlar.'*

Araştırmacının bu çıkarımı ve tablodaki veriler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Çıkarım bütünüyle doğrudur; vücut ağırlığı ve toksik birikimi en fazla olan canlı grubunun ekosistemdeki toplam biyokütlesi de her zaman en üst seviyededir.
- B) Çıkarım yanlıştır; S canlısı en fazla enerjiyi aktardığı için besin zincirinin son tüketicisidir ve vücut ağırlığına bakılmaksızın biyokütlesi en azdır.
- C) P'nin piramidin en üstünde yer aldığı tespiti doğru, ancak bu canlının toplam biyokütlesinin S'den fazla olduğu iddiası enerji akışı kurallarına aykırıdır.
- D) T canlısı R'den değil S'den doğrudan beslendiği için araştırmacı besin zinciri sıralamasını yanlış kurmuş, dolayısıyla biyokütle tahmininde yanılmıştır.